

**Inspiration til at vurdere niveauet for triagering ved ændring i borgers tilstand. Anvendes til refleksion**  
**Lyt-observer-reflekter-reager ved ethvert møde med borger**

Vanlig/habituel tilstand. Borger kan godt have en kompleks helbredstilstand.	TOBS score 0-1
<b>Har 1-3 ændringer i vanlig/habituel tilstand</b>	<b>TOBS-score &gt;1</b>
Drikker og spiser mindre	
Utilsigtet vægttab på op til 2 kg.	
Er faldtruet	
Afvigelse i afføringsmønster	
Efter nyanlæggelse af KAD, sonde m.v	
Opstart af ny medicin (Faglig vurdering om hvilke præp.+hvor længe) Obs at udfylde helbredstilstand+opfølgingsdato til vurdering af effekt)	
I øget risiko for tryksår	
Nyopstået sår	
Hævede ben	
Hududslæt	
Terminal (forventet restlevetid på dage-få uger)	
<b>Har mange eller markante ændringer i vanlig/habituel tilstand</b>	<b>TOBS-score 3-4el.</b>
<b>enkeltværdi&gt;2</b>	
Nyindflyttet (minimum 72 timer)	
Nyudskrevet (minimum 72 timer)	
Fald (minimum 24 timer)	
Har indtaget forkert medicin	
Akut opståede smerter, akut kvalme, opkast, feber, svimmelhed	
Akut forstoppelse	
Har symptomer på dehydrering: Nedsat hudturgor, koncentreret urin, svimmelhed, tørre slimhinder, sløvhed	
Har symptomer på UVI: Hyppig vandladning, grumset og ildelugtende urin, evt. feber, smerter ved vandladning, forvirret	
Har symptomer på lungebetændelse: Hoste evt. med slim, åndedrætsbesvær, evt. feber, evt. blålige negle/læber	
Utilsigtet vægttab > 2 kg.	
Ændret adfærd: F.x udadreagerende, agiteret, apatisk, hallucinationer	

**Inspiration til at vurdere niveauet for triagering ved ændring i borgers tilstand. Anvendes til refleksion**  
**Lyt-observer-reflekter-reager ved ethvert møde med borger**

Vanlig/habituel tilstand. Borger kan godt have en kompleks helbredstilstand.	TOBS score 0-1
<b>Har 1-3 ændringer i vanlig/habituel tilstand</b>	<b>TOBS-score &gt;1</b>
Drikker og spiser mindre	
Utilsigtet vægttab på op til 2 kg.	
Er faldtruet	
Afvigelse i afføringsmønster	
Efter nyanlæggelse af KAD, sonde m.v	
Opstart af ny medicin (Faglig vurdering om hvilke præp.+hvor længe) Obs at udfylde helbredstilstand+opfølgingsdato til vurdering af effekt)	
I øget risiko for tryksår	
Nyopstået sår	
Hævede ben	
Hududslæt	
Terminal (forventet restlevetid på dage-få uger)	
<b>Har mange eller markante ændringer i vanlig/habituel tilstand</b>	<b>TOBS-score 3-4el. enkeltværdi</b>
<b>&gt;2</b>	
Nyindflyttet (minimum 72 timer)	
Nyudskrevet (minimum 72 timer)	
Fald (minimum 24 timer)	
Har indtaget forkert medicin	
Akut opståede smerter, akut kvalme, opkast, feber, svimmelhed	
Akut forstoppelse	
Har symptomer på dehydrering: Nedsat hudturgor, koncentreret urin, svimmelhed, tørre slimhinder, sløvhed	
Har symptomer på UVI: Hyppig vandladning, grumset og ildelugtende urin, evt. feber, smerter ved vandladning, forvirret	
Har symptomer på lungebetændelse: Hoste evt. med slim, åndedrætsbesvær, evt. feber, evt. blålige negle/læber	
Utilsigtet vægttab > 2 kg.	
Ændret adfærd: F.x udadreagerende, agiteret, apatisk, hallucinationer	