

Inspiration til at vurdere niveauet for triagering ved ændring i borgers tilstand

Anvendes til refleksion og dialog

Lyt-observer-reflekter-reager ved ethvert møde med borger

Vanlig/habituel tilstand. TOBS score 0-1 Borger kan godt have en kompleks helbredstilstand.
Har 1-3 ændringer i vanlig/habituel tilstand TOBS-score >1
Drikker og spiser mindre
Utsigtet vægttab på op til 2 kg.
Er faldtruet
Afvigelse i afføringsmønster
Efter nyanlæggelse af KAD, sonde m.v
Opstart af ny medicin (Faglig vurdering om hvilke præp.+hvor længe) Obs at udfylde helbredstilstand+opfølgingsdato til vurdering af effekt
I øget risiko for tryksår
Nyopstået sår
Hævede ben
Hududslæt
Terminal (med forventet restlevetid på dage-få uger)
Har mange eller markante ændringer i vanlig/habituel tilstand TOBS-score 3-4el. enkeltværdi >2
Nyindflyttet (minimum 72 timer)
Nyudskrevet (minimum 72 timer)
Fald (minimum 24 timer)
Har indtaget forkert medicin
Akut opståede smerter, akut kvalme, opkast, feber, svimmelhed
Akut forstoppelse
Har symptomer på dehydrering: Nedsat hudturgor, koncentreret urin, svimmelhed, tørre slimhinder, sløvhed
Har symptomer på UVI: Hyppig vandladning, grumset og ildelugtende urin, evt. feber, smerter ved vandladning, forvirret
Har symptomer på lungebetændelse: Hoste evt. med slim, åndedrætsbesvær, evt. feber, evt. blålige negle/læber
Utsigtet vægttab > 2 kg.
Ændret adfærd: F.x udadreagerende, agiteret, apatisk, hallucinationer

Inspiration til at vurdere niveauet for triagering ved ændring i borgers tilstand
Anvendes til refleksion og dialog
Lyt-observer-reflekter-reager ved ethvert møde med borger